

DEFENCE

Bustine

F12


PROBIOTICO CEPPLO SPECIFICO **MTCC5375**

SACCHAROMYCES BOULARDII - PER BUSTINA 2 GR (8 MILIARDI - FOS E ZINCO)



Saccharomyces boulardii

- Probiotico-ceppo per la diarrea acuta infettiva, diarrea da antibiotici, diarrea da chemioterapici e diarrea del viaggiatore.
- L'unico lievito in natura classificato come probiotico, capace di mantenere e ripristinare la flora batterica intestinale del grande e piccolo intestino.
- Raccomandato dalle Linee guida Internazionali (Guarino A et al., Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 46: S81-S122, 2008) della Società di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica (ESPGHAN) e la Società Europea per le Patologie Infettive Pediatriche (ESPID).
- Uno dei probiotici con maggior studi clinici sulla diarrea.



FOS (frutto-oligosaccaridi)

- Sono catene di unità di fruttosio legate ad un glucosio terminale, derivanti dalla cicoria.
- Stimolano la crescita e l'attività di quei microrganismi che contribuiscono positivamente alla salute dell'ospite.
- L'effetto probiotico dei FOS è stato ampiamente dimostrato e numerosi studi riportano che la somministrazione di questi carboidrati causa l'aumento del numero dei microrganismi in vivo e in vitro.
- Migliorano l'assorbimento di acqua e di elettroliti nell'intestino tenue riducendo l'incidenza e la durata della diarrea.

Zinco

- Oligoelemento, presente in piccole quantità nell'organismo (circa 2g), svolge un ruolo di fondamentale importanza in quanto interviene come cofattore enzimatico in molte reazioni metaboliche.
- Efficace nel ridurre la durata della diarrea.
- Efficace nel ridurre la gravità della diarrea grave e persistente.
- Intervento terapeutico che combina basso costo, selettività d'azione per il trattamento della diarrea nei bambini e negli adulti.

INDICAZIONI

- DISBIOSI INTESTINALE
- DIARREA DA ANTIBIOTICI
- DIARREA DA CHEMIOTERAPICI
- DIARREA ACUTA INFETTIVA
- DIARREA DEL VIAGGIATORE

Si consiglia di somministrare **DEFENCE F12** ad intervalli regolari, preferibilmente a digiuno o lontano dai pasti.
1-2 bustine al giorno.

CONTROINDICAZIONI

- Ipersensibilità al principio attivo o a qualsiasi altro eccipiente.
- Pazienti portatori di catetere venoso centrale.
- Allergia ai funghi.



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI			
Sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico	Per 100 g	Per bustina 2 g	% NRI*
Saccharomyces boulardii	400 Milardi	8 Milardi	
Frutto-oligosaccaridi (FOS)	6 g	120 mg	
Zinco	312,5 mg	6,25 mg	125%

*NRI = Assunzione di Riferimento Giornaliera